

OBJECTIFS DE LA PRESCRIPTION

SEDATION

Définition

Recherche, par des moyens médicamenteux, d'une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu'à la perte de conscience dans le but de diminuer ou faire disparaître la perception d'une situation vécue comme insupportable par le patient alors que tous les moyens disponibles et adaptés à cette situation ont pu lui être proposés et/ou mis en œuvre sans permettre d'obtenir le soulagement escompté

Analyse du contexte clinique

- évolution des symptômes
- complications prévisibles

Indications

- complication aiguë à risque vital immédiat (hémorragie cataclysmique, détresse respiratoire asphyxique)
- symptôme réfractaire : tout symptôme dont la perception est insupportable et qui ne peut être soulagé en dépit des efforts obstinés pour trouver un protocole thérapeutique adapté sans compromettre la conscience du patient

Préalables

- info/accord patient
- procédure collégiale
- info entourage

Objectifs

- score 2 à 4 Echelle de Rudkin selon la situation et le souhait du patient

Utilisation

- intermittente
- en continu

ANXIOLYSE

Définition

Soulagement de l'anxiété
Apaisement avec maintien de la vigilance le jour et meilleur sommeil la nuit

Analyse du contexte clinique

- anxiété réactionnelle
- état dépressif intriqué
- confusion
- maladie psychiatrique préexistante

Indications

- angoisse persistante malgré thérapeutiques mises en place (benzodiazépines, Hydroxyllysine, antidépresseurs, neuroleptiques), ou prise orale impossible
- anxiolyse rapide et réversible par voie parentérale

Préalables

- info/accord patient

Objectifs

- score 1 Echelle de Rudkin le jour
- score 2 à 4 Echelle de Rudkin la nuit selon le souhait du patient

Utilisation

- en discontinu (ex : avant soin, à la demande, la nuit...)
- en continu